




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS



Instituto de Políticas Públicas en Salud

Relación entre alfabetización en salud y adherencia a tratamiento farmacológico en pacientes crónicos

Monsalves MJ., Durán D.,

Mañalich, J., Romero MI.

Jueves, 26 de Noviembre de 2015

Declaración de Potenciales Conflictos de Interés

**Los autores declaran no tener ningún
potencial conflicto de interés**



ANTECEDENTES

Habilidad de las personas de obtener, procesar y entender información básica de salud y de los servicios que necesitan, para tomar decisiones apropiadas sobre su salud. (Selden CR. y cols. 2000)

Personas con menores niveles de alfabetización en salud tienen peor salud autoreportada y dificultades para identificar medicamentos y mantener sus indicaciones médicas. (Peerson A. y cols. 2009)

En estudios en personas hipertensas, aquellos con menor nivel educacional y menor alfabetización en salud, no conocen sus medicamentos. (Stephen D. y cols 2007)

OBJETIVO

Evaluar la asociación entre la alfabetización en salud y la adherencia a tratamiento farmacológico en pacientes crónicos atendidos en APS en las comunas de La Florida y Puerto Montt

MÉTODO


- Estudio de corte transversal **enfoque descriptivo** a 173 personas.
- Cuestionario Spanish Adults Health Literacy Short Assesment (SAHLSA-50) y Morisky-Green para adherencia al tratamiento farmacológico
- Asistentes a los talleres del programa “Paciente empoderado”, (Instituto de Políticas Públicas en salud de la Universidad San Sebastián, con patrocinio de UNESCO y el MINSAL)
- Se realizó análisis univariado, bivariado y pruebas de contraste de hipótesis en STATA 13.0 de forma exploratoria.

La Florida y Puerto Montt

RESULTADOS

- Total de 173 individuos. 51,45%(n=89/173), de La Florida, y un 48,55%(n=84/173) de Puerto Montt.
- La edad promedio 64 años(DE=10,44) y el 79,77% (n=138/173) de la muestra son mujeres.
- 60,69%(n=105/173) se encuentra bajo tratamiento farmacológico.
- De estos, un 43,81%(n=46/105) cumple con su terapia farmacológica, mientras que un 56,19%(n=59/105) no cumple.

RESULTADOS



8,70% Inadecuado
91,30% Adecuado

13,56% Inadecuado
86,44% Adecuado

RESULTADOS

Puntaje SAHLSA-50

Morisky-Green	Promedio	Mediana	Desviación Estándar	Puntaje Mínimo	Puntaje Máximo	Asimetría
Cumplidor	45	47	5,52	23	50	-2,33
No cumplidor	42,5	43	5,42	22	50	-1,75
Total	44	45	5,57	22	50	-1,85

Test Mann-Whitney: p value=0,0005

CONCLUSIONES

- ✓ Las personas que cumplen su terapia farmacológica tienen 4 puntos más en la mediana de puntaje SAHLSA-50
 - ✓ Las diferencias reportadas son estadísticamente significativas. Sin embargo, pueden deberse a otros factores de los individuos como NE, Edad, factores de la Comuna, entre otros
- ✓ Este estudio exploratorio reporta resultados preliminares del programa PPE, que se esta realizando también en otras comunas.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS 